

51

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Int. Cl.:

C 12/14
A 61 K, 21/00

DEUTSCHES



PATENTAMT

52

Deutsche Kl.: 30 h, 7/00
30 h, 6

10

11

21

22

43

Offenlegungsschrift 2212 854

Aktenzeichen: P 22 12 854.7

Anmeldetag: 16. März 1972

Offenlegungstag: 2. November 1972

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: 17. März 1971

33

Land: Sowjetunion

31

Aktenzeichen: 1626871

54

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder: Wsesojusnyj Nautschno-Issledowatelskij Institut po Isyskaniju Nowych antibiotikow Akademii Medisinskich Nauk SSSR, Moskau

Vertreter gem. § 16 PatG: Dittmann, O., Dr.; Schiff, K. L.; Fünér, A. v., Dipl.-Chem. Dr.; Strehl, P., Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.; Patentanwälte, 8000 München

72

Als Erfinder benannt: Gauze, Georgij Fransewitsch;
Preobraschenskaja geb. Lebedewa, Tatjana Pawlowna;
Maksimowa geb. Mirenborg, Tatjana Semjonowna;
Ucholina, Rosa Sergejewna; Moskau;
Netschajewa geb. Aksjonowa, Natalja Petrowna,
Chimki Moskovskoj oblasti;
Kowscharowa geb. Komarowa, Ija Nikolajewna, Moskau (Sowjetunion)

56

Rechercheantrag gemäß § 28 a PatG ist gestellt
Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DT 2212854

2212854

B e s c h r e i b u n g
zu derPatentanmeldung
des

Wsesojusnyj Nautschno-Issledowatelskij Institut
po Isyskaniju Nowych antibiotikow Akademii Medi-
zinskich Nauk SSSR, UdSSR, Moskau, Bolschaja Firo-
gowskaja uliza, 11

betreffend

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES ANTIBIOTIKUMS HELIOMYZIN

Priorität vom 17. März 1971 UdSSR Nr. 1626871

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin, welches in Form einer 4%igen Salbe zur Heilung von Verbrennungen, verschiedener Formen von Pyodermie und auf dem Gebiete der medizinischen Kosmetik Verwendung findet, da es antibakterielle und gefäßverengende Wirkung in sich vereinigt.

Es ist ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin aus der Kultur des Strahlenpilzes Actinomyces flavochromogenes var heliomycini bekannt. Die Ausgangskultur züchtet man im Submersverfahren auf einem Nährmedium, welches 1,0 Gewichtsprozent Sojamehl; 1,5 bis 2,0 Gewichtsprozent Stärke; 0,1 Gewichtsprozent Kaliumdihydrogenphosphat; 0,3 Gewichtsprozent Natriumchlorid; 0,3 Gewichtsprozent Kaliumkarbonat; 0,1 Gewichtsprozent Pottwaltran; bis 100 ml Wasser enthält.

209845/1169

Dasselbe Nährmedium kann zum Züchten von Impfmyzelium verwendet werden.

Aus der erhaltenen Kulturflüssigkeit trennt man das Myzelium durch Filtrieren ab. Das Antibiotikum extrahiert man mit Azeton aus dem Myzelium, das eine Feuchtigkeit von 60 Gewichtsprozent aufweist. Die Extraktion wird 4 Mal durchgeführt. Für jede Extraktion nimmt man dreifaches Volumen von Azeton zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktiven Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktes doppeltes Volumen von destilliertem Wasser zugegeben. Mit dem vierten Extrakt wird die sekundäre Extraktion des Myzeliums der nächsten Fermentation durchgeführt. Das ausgefallene kristalline Heliomyzin wird abfiltriert und mit destilliertem Wasser gewaschen. Wenn das Rohheliomyzin infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht trocknet, wird es zusätzlich mit Petroläther gewaschen.

Die Ausbeute an Rohheliomyzin beträgt 3 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium. Das Rohpräparat enthält 80 bis 85 Gewichtsprozent Heliomyzin. (Siehe Urheberschein der UdSSR No. 266149).

Ein Nachteil des bekannten Verfahrens zur Herstellung von Heliomyzin aus der Kultur *Actinomyces flavochromogenes* var. *heliomycini* ist eine große Variabilität des Stammes. Bei häufigem Überimpfen und längerer Lagerung wird die Kultur in aktive und wenigaktive Varianten gespalten. Die größte Fähigkeit, das Antibiotikum in dem Myzelium zu speichern, ist den

209845/1169

Varianten eigen, deren Kolonien beim Wachstum auf einem festen organischen Nährmedium kein Luftmyzelium besitzen, auf mineralischem Nährmedium ein spärliches Luftmyzelium aufweisen und ein graubraunes Pigment ausscheiden. In diesem Zusammenhang ist die Ausbeute an Rohantibiotikum niedrig (3 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium bei der Verwendung aktiver Varianten der Kultur *Actinomyces flavochromogenes* var *heliomycini*).

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die genannten Nachteile zu vermeiden.

In Übereinstimmung mit dem Ziel wurde die Aufgabe gestellt, durch die Verwendung eines neuen Stammes die Ausbeute an Endprodukt zu steigern.

Diese Aufgabe wurde dadurch gelöst, daß man in dem Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin durch Bereitung von Impfmateriail der Kultur des Heliomyzinproduzenten, Beimpfen mit diesem von Nährmedium unter anschließender Fermentation, Abtrennung des Myzeliums und Isolierung aus diesem des Endproduktes erfindungsgemäß als Kultur des Heliomyzinproduzenten den Stamm 6383 *Actinomyces variabilis* var *roseolus* verwendet, der durch folgende kulturmorphologische und physiologische Eigenschaften gekennzeichnet wird: er bildet auf dem mineralischen Nährmedium Gause No. 1 ein reichliches graues Luftmyzelium, das Substratmyzelium ist farblos, er färbt das Nährmedium schwach braun-rosa oder

209845/1169

violett-braun, die Sporenträger sind spiralförmig mit 2 bis 4 Windungen der Spirale, die Sporen sind mit langen Härchen bedeckt; auf dem organischen Nährmedium Gause No. 2 ist das Luftmyzelium zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium ist graubraun-gelb bis dunkelgraubraun; auf dem Czapek-Nährmedium und Lindenbein-Nährmedium ist das Luftmyzelium reichlich grau, das Substratmyzelium braun; auf dem Glukose-Asparagin-Agar ist das Luftmyzelium spärlich, zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium graubraun-gelb, färbt das Nährmedium nicht, nimmt auf flüssigen Nährmedien bei einer Temperatur von 28°C Laktose, Galaktose, Saccharose gut, Glukose mäßig und Dulzit schwach auf; abgetrennt aus dem Boden und selektiert durch natürliche Wahl und Ultraviolettbestrahlung.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird wie folgt durchgeführt.

Als Ausgangskultur verwendet man den Stamm Nr. 6383 *Actinomyces variabilis* var *roseous*l. Diese Kultur unterscheidet sich von der früher beschriebenen Kultur Nr. 2915 *Actinomyces flavochromogenes* var *heliomycini* durch die Bildung eines braunen Substratmyzeliums und löslicher Pigmente bräunlichrosafarbener oder violett-brauner Farbtöne beim Wachstum auf synthetischen Nährmedien sowie durch reichliches Sporentragen des grauen Luftmyzeliums auf diesen Nährmedien.

Die Ausgangskultur wird im Submersverfahren auf dem Sojamehl-Stärke-Nährmedium gezüchtet.

209845/1169

Das gleiche Nährmedium kann zur Züchtung von Impfmyzelium verwendet werden.

Das Antibiotikum ist im Myzelium enthalten, welches von der Kulturflüssigkeit durch Filtrieren abgetrennt wird. Das Antibiotikum extrahiert man mit Azeton aus dem Myzelium, das eine Feuchtigkeit von etwa 60 Gewichtsprozent aufweist. Die Extraktion wird 4 Mal durchgeführt. Für jede Extraktion nimmt man ein dreifaches Volumen von Azeton zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktive Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktes doppeltes Volumen von destilliertem Wasser zugesetzt.

Mit dem vierten Extrakt führt man die sekundäre Extraktion des Myzeliums der nächsten Fermentation durch. Es fällt kristallines Heliomyzin aus, welches abfiltriert und mit destilliertem Wasser gewaschen wird. Falls das Rohantibiotikum infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht trocknet, wird dieses zusätzlich mit Petroläther gewaschen. Die Ausbeute an Rohheliomyzin beträgt 4 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium. Das Rohpräparat enthält 80-85 Gewichtsprozent Heliomyzin, bezogen auf das chemisch reine kristalline Präparat.

Ein Vorteil des vorliegenden Verfahrens ist die Verwendung eines neuen und produktiveren Stammes, des Stammes Nr. 6383 *Actinomyces variabilis* var. *roseous* 1, bei dessen Verwendung die Ausbeute an kristallinem Heliomyzin auf 4 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium, gesteigert werden kann.

209845/1169

Beispiel

Zur Herstellung von Sporenmaterial züchtet man den Stamm Nr. 6383 *Actinomyces variabilis* var *roseolus* in Reagenzgläsern mit abgeschrägtem synthetischem Nährmedium Gause Nr. 1 während 10 Tage bei einer Temperatur von 28°C. Zur Herstellung von Impfmyzelium werden mit den Sporen der Kultur Erlenmeyerkolben von 500 ml Fassungsvermögen beimpft, die 100 ml Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) enthalten: Sojamehl 1,0; Stärke 1,0; Natriumchlorid 0,3; Kalziumkarbonat 0,3; Kaliumdihydrogenphosphat; Wasser bis 100 ml, pH des Nährmediums nach der Sterilisation 7,0.

Das Impfmyzelium züchtet man in den Kolben 2 Tage bei einer Temperatur von 28°C auf Schaukeln, die bei 200 U/min arbeiten.

5 Gewichtsprozent des gezüchteten Impfmyzeliums (400 ml im Kolben) bringt man in Impffermenter von 45 Liter Fassungsvermögen ein, die 20 Liter Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) enthalten: Sojamehl 1,0; Stärke 1,0; NaCl 0,3; CaCO₃ 0,3; KH₂PO₄ 0,1; Pottwaltran 0,1; Wasser bis 100 ml; pH des Mediums nach der Sterilisation 7,0.

Man sterilisiert 45 Minuten bei einer Temperatur von 120°C. Dann erfolgt die Züchtung bei einer Temperatur von 28°C unter einem Druck von 0,3 bis 0,5 at, bei einem Belüftungsgrad von 1 Liter Luft je 1 Liter Nährmedium in der Minute bei eingeschaltetem Rührwerk, das bei 300 U/min arbeitet.

209845/1169

Nach 48 Stunden Züchten wird das Impfmateriail den Fermentern zugeführt. In die Fermenter von 500 Liter Fassungsvermögen bringt man Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) ein: Sojamehl 1,0; Stärke 2,0; NaCl 0,3; CaCO_3 0,3; KH_2PO_4 0,1; Pottwaltran 0,1; Wasser bis 100 ml, pH des Nährmediums nach der Sterilisation 7,0.

Man sterilisiert 45 Minuten bei einer Temperatur von 120°C . Die Beimpfung erfolgt aus den Impfapparaten, wobei man 20 Liter Impfmateriail je 300 Liter Nährmedium (5 bis 7 Gewichtsprozent Impfmateriail) nimmt. Die Fermentation erfolgt bei einer Temperatur von 28°C unter einem Druck von 0,3 bis 0,5 at, bei einem Belüftungsgrad von 1 Liter Luft je 1 Liter Nährmedium in der Minute bei eingeschaltetem Rührwerk, das bei 300 U/min arbeitet. Die Fermentation dauert 96 bis 120 Stunden.

Man filtriert die Kulturflüssigkeit und erhält gegen 30 kg Mizelium mit einer Feuchtigkeit von etwa 60 Gewichtsprozent.

Das Myzelium extrahiert man mit Azeton 4 Male. Für jede Extraktion nimmt man dreifaches Volumen von Azeton (90 Liter) zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktive Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktres doppeltes Volumen von destilliertem Wasser (360 Liter) zugesetzt. Dabei fällt das Rohheliomyzin aus, welches man abfiltriert und mit destilliertem Wasser wäscht. Falls das Rohpräparat infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht

209845/1169

trocknet, wird es zusätzlich mit 5 bis 10 fachem Volumen von Petroleumäther zum kristallinen Rohpräparat gewaschen.

Die aus 30 kg feuchtem Myzelium (Feuchtigkeit 60%) erzielte Ausbeute an Rohpräparat beträgt 1200 g. Das Rohpräparat enthält 80 bis 85 Gewichtsprozent Heliomyzin, umgerechnet auf chemisch reines kristallines Präparat.

209845/1169

2212854

P A T E N T A N S P R U C H:

Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin durch Bereitung von Impfmateriail der Kultur des Heliomyzinproduzenten, Beimpften mit diesem von Nährmedium unter anschließender Fermentation, Abtrennung des Myzeliums und Isolierung des Endproduktes, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß man als Kultur des Heliomyzinproduzenten den Stamm 6383 *Actinomyces variabilis* var *roseolus* verwendet, der durch folgende kulturmorphologische und physiologische Eigenschaften gekennzeichnet wird: er bildet auf dem mineralischen Nährmedium Gause Nr. 1 ein reichliches graues Luftmyzelium, das Substratmyzelium ist farblos, er färbt das Nährmedium schwach braun-rosa oder violettbraun, die Sporenträger sind spiralförmig mit 2 bis 4 Windungen der Spirale, die Sporen sind mit langen Härchen bedeckt; auf dem organischen Nährmedium Gause Nr. 2 ist das Luftmyzelium zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzel ist graubraun-gelb bis dunkelgraubraun; auf dem Czapek-Nährmedium und Lindenbein-Nährmedium ist das Luftmyzelium reichlich, grau, das Substratmyzelium braun; auf dem Glukose-Aspargin-Agar ist das Luftmyzelium spärlich, zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium graubraungelb, färbt das Nährmedium nicht, nimmt auf flüssigen Nährmedien bei einer Temperatur von 28°C Laktose, Galaktose, Saccharose gut, Glukose mäßig und Dulzit schwach auf; abgetrennt aus dem Boden und selektioniert durch natürliche Wahl und Ultraviolettbestrahlung.

209845/1169

ORIGINAL INSPECTED

2212854

B e s c h r e i b u n g
zu derPatentanmeldung
des

Wsesojusnyj Nautschno-Issledowatelskij Institut
po Isyskaniju Nowych antibiotikow Akademii Medi-
zinskich Nauk SSSR, UdSSR, Moskau, Bolschaja Piro-
gowskaja uliza, 11

betreffend

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES ANTIBIOTIKUMS HELIOMYZIN

Priorität vom 17. März 1971 UdSSR Nr. 1626871

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin, welches in Form einer 4%igen Salbe zur Heilung von Verbrennungen, verschiedener Formen von Pyodermie und auf dem Gebiete der medizinischen Kosmetik Verwendung findet, da es antibakterielle und gefäßverengende Wirkung in sich vereinigt.

Es ist ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin aus der Kultur des Strahlenpilzes *Actinomyces flavochromogenes* var. *heliomycini* bekannt. Die Ausgangskultur züchtet man im Submersverfahren auf einem Nährmedium, welches 1,0 Gewichtsprozent Sojamehl; 1,5 bis 2,0 Gewichtsprozent Stärke; 0,1 Gewichtsprozent Kaliumdihydrogenphosphat; 0,3 Gewichtsprozent Natriumchlorid; 0,3 Gewichtsprozent Kaliumkarbonat; 0,1 Gewichtsprozent Pottwaltran; bis 100 ml Wasser enthält.

209845/1169



Dasselbe Nährmedium kann zum Züchten von Impfmyzelium verwendet werden.

Aus der erhaltenen Kulturflüssigkeit trennt man das Myzelium durch Filtrieren ab. Das Antibiotikum extrahiert man mit Azeton aus dem Myzelium, das eine Feuchtigkeit von 60 Gewichtsprozent aufweist. Die Extraktion wird 4 Mal durchgeführt. Für jede Extraktion nimmt man dreifaches Volumen von Azeton zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktiven Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktes doppeltes Volumen von destilliertem Wasser zugegeben. Mit dem vierten Extrakt wird die sekundäre Extraktion des Myzeliums der nächsten Fermentation durchgeführt. Das ausgefallene kristalline Heliomyzin wird abfiltriert und mit destilliertem Wasser gewaschen. Wenn das Rohheliomyzin infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht trocknet, wird es zusätzlich mit Petroläther gewaschen.

Die Ausbeute an Rohheliomyzin beträgt 3 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium. Das Rohpräparat enthält 80 bis 85 Gewichtsprozent Heliomyzin. (Siehe Urheberschein der UdSSR No. 266149).

Ein Nachteil des bekannten Verfahrens zur Herstellung von Heliomyzin aus der Kultur *Actinomyces flavochromogenes* var. *heliomycini* ist eine große Variabilität des Stammes. Bei häufigem Überimpfen und längerer Lagerung wird die Kultur in aktive und wenigaktive Varianten gespalten. Die größte Fähigkeit, das Antibiotikum in dem Myzelium zu speichern, ist den

209845/1169



violett-braun, die Sporenträger sind spiralförmig mit 2 bis 4 Windungen der Spirale, die Sporen sind mit langen Härchen bedeckt; auf dem organischen Nährmedium Gause No. 2 ist das Luftmyzelium zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium ist graubraun-gelb bis dunkelgraubraun; auf dem Czapek-Nährmedium und Lindenbein-Nährmedium ist das Luftmyzelium reichlich grau, das Substratmyzelium braun; auf dem Glukose-Asparagin-Agar ist das Luftmyzelium spärlich, zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium graubraun-gelb, färbt das Nährmedium nicht, nimmt auf flüssigen Nährmedien bei einer Temperatur von 28°C Laktose, Galaktose, Saccharose gut, Glukose mäßig und Dulzit schwach auf; abgetrennt aus dem Boden und selektio- niert durch natürliche Wahl und Ultraviolettbestrahlung.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird wie folgt durchge- führt.

Als Ausgangskultur verwendet man den Stamm Nr. 6383 *Acti- nomyces variabilis* var *roseous*l. Diese Kultur unterscheidet sich von der früher beschriebenen Kultur Nr. 2915 *Actinomyces flavochromogenes* var *heliomycini* durch die Bildung eines bra- unen Substratmyzeliums und löslicher Pigmente bräunlichrosa- farbener oder violett-brauner Farbtöne beim Wachstum auf synthetischen Nährmedien sowie durch reichliches Sporentra- gen des grauen Luftmyzeliums auf diesen Nährmedien.

Die Ausgangskultur wird im Submersverfahren auf dem Soja- mehl-Stärke-Nährmedium gezüchtet.

209845/1169



Das gleiche Nährmedium kann zur Züchtung von Impfmyzelium verwendet werden.

Das Antibiotikum ist im Myzelium enthalten, welches von der Kulturflüssigkeit durch Filtrieren abgetrennt wird. Das Antibiotikum extrahiert man mit Azeton aus dem Myzelium, das eine Feuchtigkeit von etwa 60 Gewichtsprozent aufweist. Die Extraktion wird 4 Mal durchgeführt. Für jede Extraktion nimmt man ein dreifaches Volumen von Azeton zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktive Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktes doppeltes Volumen von destilliertem Wasser zugesetzt.

Mit dem vierten Extrakt führt man die sekundäre Extraktion des Myzeliums der nächsten Fermentation durch. Es fällt kristallines Heliomyzin aus, welches abfiltriert und mit destilliertem Wasser gewaschen wird. Falls das Rohantibiotikum infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht trocknet, wird dieses zusätzlich mit Petroläther gewaschen. Die Ausbeute an Rohheliomyzin beträgt 4 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium. Das Rohpräparat enthält 80-85 Gewichtsprozent Heliomyzin, bezogen auf das chemisch reine kristalline Präparat.

Ein Vorteil des vorliegenden Verfahrens ist die Verwendung eines neuen und produktiveren Stammes, des Stammes Nr. 6383 *Actinomyces variabilis* var. *roseous* 1, bei dessen Verwendung die Ausbeute an kristallinem Heliomyzin auf 4 Gewichtsprozent, bezogen auf das feuchte Myzelium, gesteigert werden kann.

209845/1169

Beispiel

Zur Herstellung von Sporenmaterial züchtet man den Stamm Nr. 6383 *Actinomyces variabilis* var *roseolus* in Reagenzgläsern mit abgeschrägtem synthetischem Nährmedium Gause Nr. 1 während 10 Tage bei einer Temperatur von 28°C. Zur Herstellung von Impfmyzelium werden mit den Sporen der Kultur Erlenmeyerkolben von 500 ml Fassungsvermögen beimpft, die 100 ml Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) enthalten: Sojamehl 1,0; Stärke 1,0; Natriumchlorid 0,3; Kalziumkarbonat 0,3; Kaliumdihydrogenphosphat; Wasser bis 100 ml, pH des Nährmediums nach der Sterilisation 7,0.

Das Impfmyzelium züchtet man in den Kolben 2 Tage bei einer Temperatur von 28°C auf Schaukeln, die bei 200 U/min arbeiten.

5 Gewichtsprozent des gezüchteten Impfmyzeliums (400 ml im Kolben) bringt man in Impffermenter von 45 Liter Fassungsvermögen ein, die 20 Liter Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) enthalten: Sojamehl 1,0; Stärke 1,0; NaCl 0,3; CaCO₃ 0,3; KH₂PO₄ 0,1; Pottwaltran 0,1; Wasser bis 100 ml; pH des Mediums nach der Sterilisation 7,0.

Man sterilisiert 45 Minuten bei einer Temperatur von 120°C. Dann erfolgt die Züchtung bei einer Temperatur von 28°C unter einem Druck von 0,3 bis 0,5 at, bei einem Belüftungsgrad von 1 Liter Luft je 1 Liter Nährmedium in der Minute bei eingeschaltetem Rührwerk, das bei 300 U/min arbeitet.

209845/1169



Nach 48 Stunden Züchten wird das Impfmateriel den Fermentern zugeführt. In die Fermenter von 500 Liter Fassungsvermögen bringt man Nährmedium der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozenten) ein: Sojamehl 1,0; Stärke 2,0; NaCl 0,3; CaCO_3 0,3; KH_2PO_4 0,1; Pottwaltran 0,1; Wasser bis 100 ml, pH des Nährmediums nach der Sterilisation 7,0.

Man sterilisiert 45 Minuten bei einer Temperatur von 120°C . Die Beimpfung erfolgt aus den Impfapparaten, wobei man 20 Liter Impfmateriel je 300 Liter Nährmedium (5 bis 7 Gewichtsprozent Impfmateriel) nimmt. Die Fermentation erfolgt bei einer Temperatur von 28°C unter einem Druck von 0,3 bis 0,5 at, bei einem Belüftungsgrad von 1 Liter Luft je 1 Liter Nährmedium in der Minute bei eingeschaltetem Rührwerk, das bei 300 U/min arbeitet. Die Fermentation dauert 96 bis 120 Stunden.

Man filtriert die Kulturflüssigkeit und erhält gegen 30 kg Mizelium mit einer Feuchtigkeit von etwa 60 Gewichtsprozent.

Das Myzelium extrahiert man mit Azeton 4 Male. Für jede Extraktion nimmt man dreifaches Volumen von Azeton (90 Liter) zum Gewicht des feuchten Myzeliums. Der erste wenigaktive Extrakt wird verworfen und dem Gemisch des zweiten und dritten Extraktres doppeltes Volumen von destilliertem Wasser (360 Liter) zugesetzt. Dabei fällt das Rohheliomyzin aus, welches man abfiltriert und mit destilliertem Wasser wäscht. Falls das Rohpräparat infolge einer Verunreinigung durch Öl schlecht

209845/1169



trocknet, wird es zusätzlich mit 5 bis 10 fachen Volumen von Petroleumäther zum kristallinen Rohpräparat gewaschen.

Die aus 30 kg feuchtem Myzelium (Feuchtigkeit 60%) erzielte Ausbeute an Rohpräparat beträgt 1200 g. Das Rohpräparat enthält 80 bis 85 Gewichtsprozent Heliomyzin, unge-rechnet auf chemisch reines kristallines Präparat.

209845/1169

2212854

P A T E N T A N S P R U C H:

Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Heliomyzin durch Bereitung von Impfmateriail der Kultur des Heliomyzinproduzenten, Beimpften mit diesem von Nährmedium unter anschließender Fermentation, Abtrennung des Myzeliums und Isolierung des Endproduktes, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß man als Kultur des Heliomyzinproduzenten den Stamm 6383 Actinomyces variabilis var roseolus verwendet, der durch folgende kulturmorphologische und physiologische Eigenschaften gekennzeichnet wird: er bildet auf dem mineralischen Nährmedium Gause Nr. 1 ein reichliches graues Luftmyzelium, das Substratmyzelium ist farblos, er färbt das Nährmedium schwach braun-rosa oder violettbraun, die Sporenträger sind spiralförmig mit 2 bis 4 Windungen der Spirale, die Sporen sind mit langen Härchen bedeckt; auf dem organischen Nährmedium Gause Nr. 2 ist das Luftmyzelium zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzel ist graubraun-gelb bis dunkelgraubraun; auf dem Czapek-Nährmedium und Lindenbein-Nährmedium ist das Luftmyzelium reichlich, grau, das Substratmyzelium braun; auf dem Glukose-Asparagin-Agar ist das Luftmyzelium spärlich, zunächst cremefarben, dann grau, das Substratmyzelium graubraungelb, färbt das Nährmedium nicht, nimmt auf flüssigen Nährmedien bei einer Temperatur von 28°C Laktose, Galaktose, Saccharose gut, Glukose mäßig und Dulzit schwach auf; abgetrennt aus dem Boden und selektioniert durch natürliche Wahl und Ultraviolettbestrahlung.

209845/1169

ORIGINAL INSPECTED

